Exemplar (Fig 3a) beide unter dem Namen Triton tritonis ab, welche auch die bei meinen Stücken auffälligen Verschiedenheiten zeigen. Bei der westindischen Art sind die im inneren auf dem Mündungsrand sitzenden weissen Zähne paarig, während bei der andern Art diese nur durch einfache dunkle Erhöhungen, die nach innen hin-verlaufen, angedeutet sind. Auch erweitert sich bei der ostindischen Form der Mündungsrand stark nach aussen, während dies bei der westindischen nicht der Fall ist. Ferner sind auch die Falten auf dem Spindelrand bei beiden verschieden, wie meine und die Reeve'schen Abbildungen zeigen.

Conrad beschreibt die in Westindien vorkommende Art in der Proc. of the Academy of Nat. Soc. of Philadelphia Vol. IV 1848 als Triton nobilis.

## Verzeichnis
## der Land- und Süsswasser-Mollusken Münchens.

Im Nachfolgenden gebe ich ein Verzeichnis der von mir in München im Zeitraum von 2 Jahren gesammelten Mollusken bekannt; als Fundorte kommen hierbei nur München und seine allernächste Umgebung (Pasing, Grosshesselohe, Baierbrunn) in Betracht.

München. W. Blume.

1. Limax (Heynemannia) maximus L.
   var. cinereo-niger Wolf.
2. Limax (Simrothia) arborum Bouch.
3. Agriolimax agrestis L.
4. Vitrina (Phenacolimax) pellucida Müll.
5. Vitrina (Semilimax) diaphana Drp.
6. Vitrina (Semilimax) brevis Fer.
7. Hyalina (Polita) lucida Drp.
   (Draparnaldi Beck)
8. Hyalina (Polita) cellaria Müll.

9. Hyalina (Polita) nitens Mich.
10. Hyalina (Polita) pura Ald.
11. Hyalina (Vitrea) crystallina Müll.
12. Euconulus fulvus Müll.
13. Zonitoides nitidus Müll.
14. Arion empiricorum Fer.
15. Patula rotundata Müll.
16. Helix (Vallonia) pulchella Müll.
17. Helix (Vallonia) costata Müll.
18. Helix (Trigonostoma) obvoluta Müll.
19. Helix (Triodopsis) personata Lm.
20. Helix (Trochiscus) cobresiana Alt.-unidentata Drp.
21. Helix (Fruticicola( fruticum Müll.
22. Helix (Trichia) hispida L.
23. Helix (Trichia) sericea Drp.
24. Helix (Monacha) incarnata Müll.
25. Helix (Monacha) umbrosa Prtsch.
26. Helix (Monacha) villosa Drp.
27. Helix (Helicella) candicans Zglr.
28. Helix (Chilotrema) lapicida L.
29. Helix (Arianta) arbustorum L.
30. Helix (Arianta) arbustorum L.
    var. trochoidalis Cless.
31. Helix (Tachea) hortensis Müll.
32. Helix (Tachea) nemoralis L.
33. Helix Pomatia) pomatia L.
34. Buliminus (Ena) montanus Drp.
35. Buliminus (Ena) obscurus Müll.
36. Cionella (Zua) lubrica Müll.
37. Cionella (Acicula) acicula Müll. Im Auswurf der Isar.
38. Pupa (Torquilla) frumentum Drp.
39. Pupa (Orcula) dolium Drp. Im Auswurf der Isar.
40. Pupa (Pupilla) muscorum Müll.
41. Pupa (Vertigo) pygmaea Drp. Im Auswurf der Isar.

42. Pupa (Vertigo) angustior Jeffr. Im Auswurf der Isar.
43. Clausilia (Clausiliastra) laminata Mtg.
44. Clausilia (Alinda) biplicata Mtg.
45. Clausilia (Alinda) plicata Drp.
46. Clausilia (Strigillaria) cana Hld.
47. Clausilia (Pirostoma) ventricosa Drp.
48. Clausilia (Kuzmicia) parva Stud.
49. Succinea (Amphibina) putris L.
50. Succinea (Amphibina) putris L.
    var. bavarica Cless.
51. Succinea (Amphibina) Pfeifferi Rossm.
52. Carychium minimum Müll.
53. Valvata piscinalis Müll.
54. Bythinia tentaculata L.
55. Bythinella schmidtii Charp. Baierbrunn.
56. Limnaea (Limnus) stagnalis L.
57. Limnaea (Gulnaria) auricularia L.
58. Limnaea (Gulnaria) ampla Hrtm.
59. Limnaea (Gulnaria) ampla
    var. monnardi Hrtm.
60. Limnaea (Limnophysa) ovata Drp.
61. Limnaea (Limnophysa) palustris Müll.
62. Limnaea (Limnophysa) palustris var. fusca C. Pfr.
63. Physa acuta Drp. Im botanischen Garten.
64. Planorbis (Coretus) limophilus Westl.
65. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Müll.
66. Planorbis (Tropidiscus) carinatus Müll.
67. Planorbis (Spirorbis) rotundatus Poir.
68. Planorbis (Gyraulus) contortus L.
69. Planorbis (Gyraulus) glaber Jeffr.
70. Ancylus gibbosus Brgt. In einem Altwasser der Isar: scheinbar sehr selten.
71. Anodonta piscinalis Nilss.
72. Anodonta cellensis Schroet.

73. Sphaerium corneum L.
74. Calyculina lacustris Müll.
    var. major Dup. Im botanischen Garten.
75. Pisidium (Fossarina) obtusale C. Pfr.

## Vorläufige Mitteilung über die Molluskenformen des Eppendorfer Moores bei Hamburg.

Von

Dr. L. Lindinger.

Das im Verschwinden begriffene Eppendorfer Moor im N. von Hamburg ist in letzter Zeit Gegenstand floristischer und faunistischer Untersuchungen geworden. Eine Arbeit der zweiten Art — *G. Uhner*, zur Fauna des Eppendorfer Moores bei Hamburg*) — gibt auch eine Aufzählung der im Moor lebenden Mollusken, (p. 21) soweit sie von Herrn Uhner gefunden wurden. Es sind nicht gerade viel, elf Wassermollusken: *Amphipeplea glutinosa*, *Bythinia tentaculata*, *Limnaea auricularia*, *L. palustris*, *L. stagnalis*, *Physa fontinalis*, *Planorbis contortus*, *Pl. marginatus*, *Pl. nitidus*, *Paludina vivipara*. Im gleichen Jahr, 1904, erschien die „Conchylien-Fauna des Nieder-Elbegebiets“ von Hartwig Petersen,**) worin für das Moor gleichfalls elf Wasserschnecken angegeben werden: *Amphipeplea. glutinosa*, *Limnaea glabra*, *L. ovata*, *L. peregra*, *L. stagnalis var. vulgaris*, *Physa fontinalis*, *Planorbis complanatus*, *Pl. contortus*, *Pl. marginatus*, *Pl. nitidus*, *Vivipara vera*.

In beiden Aufzählungen sind nur die Wassermollusken berücksichtigt worden. Von Interesse ist die sichere Konstatierung der *Amphipeplea*.

---

*) Verh. natuwiss. Hamburg 1903 3. F. XI. 1904 p. 1—25.

**) Verh. Ver. naturwiss. Unterh. Hamburg XII. 1904 p. 60—90.